

**臺南市立安南醫院(TMANH)**  
**血管穿刺後止血器部分給付暨自費說明書**  
全民健康保險特殊材料給付規定

這份說明書是說明有關您即將接受的手術之內容、效益、風險、以及替代方式，做為您與醫師討論的補充資料。最重要的是我們希望您能充分瞭解本份說明書的內容，所以請您仔細閱讀，如果您對這次手術有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。

I. 自費(差額)特材名稱

血管穿刺後止血器 Angio-Seal

II. 自費(差額)特材金額

價格依型號不同而異，金額詳見如下

自費項目名稱	應付金額
“聖猷達”血管穿刺後止血器 “SJM” Angio-Seal vascular closure device	14,175 元

III. 產品特性

用於導管治療或導管攝影檢查術後止血功能，可減少傳統術後因加壓止血造成的疼痛與起居不便。

IV. 使用規範及適應症

大腿的股動脈比手部的橈動脈粗大，從股動脈做心導管手術，比較容易也比較安全，但是卻較不為患者所接受，主要是因為術後必須使用砂袋在傷口加壓止血，平躺觀察8-24小時，完全不可以翻身轉動，連大小便也必須在床上解決，往往造成病患腰酸背痛，極度不適。血管穿刺後止血器Angio-seal使用了新的生化科技，在心導管手術後能將血管上的洞口迅速封住，完全不需要使用砂袋加壓，而且術後30分鐘至2小時就可以下床活動，對病患手術後的舒適及安全有很大的幫助。

V. 應注意事項

服用抗凝血藥物或凝血不易的病人建議平躺時間需延長3-4小時，有必要時可配合加壓沙袋。手術後2-3小時內的病人可側翻，但傷口部位的腳請放鬆伸直，不可彎曲。

**臺南市立安南醫院(TMANH)**  
**血管穿刺後止血器部分給付暨自費說明書**  
全民健康保險特殊材料給付規定

VI. 副作用

可能會使縫合部位產生急性發炎反應。本器材使用的縫合線短期在體內不會被吸收，且強度在體內也不會有明顯的改變，與本器材使用的縫合線有關的不良反應包括傷口裂開、當縫合線與尿液及膽汁等鹽類溶液長期接觸時，可能會使尿道或膽道形成結石、細菌感染的機會增加、組織出現急性發炎反應、及傷口部位疼痛、水腫或血腫...等可能性併發症，但不至於感染、血管壁貫穿及形成血栓。

VII. 與健保(已)給付品項之療效比較(或替代選擇)說明

	<b>Angio-Seal 止血器</b>	<b>傳統止血</b>
<b>方法與步驟</b>	將止血器(包括固定錨、膠原蛋白及縫線)置入體內，在傷口部位以三明治方式夾起閉合，以達到止血效果	徒手在傷口上加壓止血
<b>止血時間</b>	2-3 小時內就可以下床活動	8~24 小時，在此時間完全不可以翻身活動，相當不方便
<b>舒適度</b>	無須加壓，止血器置入程序不超過兩分鐘	加壓導致疼痛

醫師簽章：\_\_\_\_\_ 說明日期：民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

病人或家屬簽名：\_\_\_\_\_

臺南市立安南醫院(TMANH)

心臟血管外科 敬啟